

# ALANTAN PLUS KREM (20 mg + 50 mg)/g, 35 g



cena: 9,99 PLN

## Opis słownikowy

Postać	krem
Producent	UNIA
Rodzaj rejestracji	Kosmetyk leczniczy
Zastosowanie	leczenie ran, oparzeń, stanów zapalnych skóry

## Opis produktu

### ALANTAN PLUS KREM - działanie:

alantoina działa złuszcząco oraz osłaniająco na skórę, poprawia jej nawilżenie oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzenie wzrostu nowej tkanki. Stosowana regularnie, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka). Dekspantenol w skórze przekształca się w kwas pantotenowy. Zwiększone zapotrzebowanie na kwas pantotenowy występuje w przypadku uszkodzeń i różnego rodzaju chorób skóry. Dekspantenol ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry.

### ALANTAN PLUS KREM - wskazania:

pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej, leczenie różnego rodzaju ran, jak: otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry, leczenie oparzeń słonecznych oraz oparzeń po radioterapii i fototerapii, zapobieganie odparzeniom u niemowląt, nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp; wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi. Dla dzieci i niemowląt oraz dorosłych.

### ALANTAN PLUS KREM - skład:

1 g kremu zawiera 20 mg alantoiny i 50 mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym); pozostałe substancje: lanolina, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, etylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, polawax NF

### ALANTAN PLUS KREM - sposób użycia:

do stosowania miejscowego na skórę. Miejsca chorobowo zmienione należy smarować zwykle raz lub kilka razy na dobę. Pielęgnacja niemowląt - stosować na miejsca narażone na odparzenia (po każdej zmianie pieluchy). Przed nałożeniem kremu, skórę należy umyć i osuszyć.

### ALANTAN PLUS KREM - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na alantoinę, deksopantenol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; nie stosować do oczu ani na zmiany skórne w

okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sącących

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.