

ALANTAN PLUS MAŚĆ (20 mg + 50 mg), 30 g

cena: 9,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	maść
Producent	UNIA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	leczenie ran, oparzeń, stanów zapalnych skóry

Opis produktu

ALANTAN PLUS MAŚĆ - działanie:

alantoina działa złuszcząco oraz osłaniająco na skórę, poprawia jej nawilżenie oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzenie wzrostu nowej tkanki. Stosowana regularnie, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka). Deksopantenol w skórze przekształca się w kwas pantotenowy. Zwiększone zapotrzebowanie na kwas pantotenowy występuje w przypadku uszkodzeń i różnego rodzaju chorób skóry. Deksopantenol ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry.

ALANTAN PLUS MAŚĆ - wskazania:

zapobieganie oparzeniom u niemowląt, leczenie różnego rodzaju ran, jak: otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry; leczenie oparzeń słonecznych oraz oparzeń po radioterapii i fototerapii; pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej; nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp; wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi. Dla dzieci i niemowląt oraz dorosłych.

ALANTAN PLUS MAŚĆ - skład:

1 g maści zawiera 20 mg alantoiny i 50 mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym); pozostałe substancje: lanolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona

ALANTAN PLUS MAŚĆ - sposób użycia:

do stosowania miejscowego na skórę. Miejsca chorobowo zmienione należy smarować zwykle raz lub kilka razy na dobę. Pielęgnacja niemowląt - stosować na miejsca narażone na oparzenia (po każdej zmianie pieluchy). Przed nałożeniem kremu skórę należy umyć i osuszyć.

ALANTAN PLUS MAŚĆ - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na alantoinę, deksopantenol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku; nie stosować do oczu ani na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.