

ALBOTHYL 90 mg, 6 globulek dopochwowych



cena: 37,49 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Postać | globulki |
| Producent | TAKEDA |
| Rodzaj rejestracji | lek OTC |
| Zastosowanie | w stanach zapalnych dróg rodnych |

Opis produktu

ALBOTHYL 90 mg - działanie:

polikrezulen zawarty w leku działa wybiórczo na białka tkanek martwiczo i chorobowo zmienionych. Nie działa na tkanki zdrowe. Kwaśny odczyn leku (niskie pH) niszczy bakterie.

ALBOTHYL 90 mg - wskazania:

miejscowe leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy. Lek nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poniżej 18 lat ani w okresie menopauzy, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu leku u pacjentek z tych grup wiekowych.

ALBOTHYL 90 mg - skład:

1 globulka zawiera 90 mg polikrezulenu; pozostałe składniki to: makrogl 4000, makrogl 1500, kwas edetynowy

ALBOTHYL 90 mg - dawkowanie:

dopochwowo 1 globulka na dobę lub co drugi dzień. Globulki należy stosować na noc i do czasu ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż przez 9 dni.

ALBOTHYL 90 mg - przeciwwskazania:

- uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nie stosować w czasie miesiączki

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.