

AMOL, 150 ml



cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	płyn
Producent	TAKEDA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	niestrawność, po ukąszeniach owadów

Opis produktu

AMOL - działanie:

działanie leku wynika z działania poszczególnych substancji czynnych (olejek mięty pieprzowej, olejek lawendowy, olejek cytronelowy, olejek cynamonowy, olejek goździkowy, olejek cytrynowy, mentol). Lek przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych niżej wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

AMOL - wskazania:

zewnątrznie:

- w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych
- w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów

wewnątrznie:

- w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych), np. wzdęcia i niestrawność

AMOL - skład:

1 g leku Amol zawiera substancje czynne: Mentholum (mentol) 17,23 mg; Citronellae aetheroleum (olejek cytronelowy) 1,00 mg; Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 1,00 mg; Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek cynamonowy) 2,40 mg; Limonis aetheroleum (olejek cytrynowy) 5,70 mg; Menthae piperitae aetheroleum (olejek mięty pieprzowej) 2,40 mg; Lavandulae aetheroleum (olejek lawendowy) 2,40 mg; pozostałe składniki: etanol 96% (v/v), woda

AMOL - dawkowanie:

Leku nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

- zewnętrznie do nacierañ w celu poprawy złego samopoczucia (np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych) - nacierać niewielką ilością leku w formie nierozcieńczonej kilka razy na dobę
- zewnętrznie w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów - miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem w formie nierozcieńczonej
- doustnie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) - od 10 do 15 kropli leku z płynem lub z cukrem, należy przyjmować doraźnie w przypadku
- wystąpienia dolegliwości, do 3 razy na dobę

AMOL - przeciwwskazania:

- uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- astma oskrzelowa i inne schorzenia dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych
- wiek poniżej 12 lat
- przeciwwskazania do stosowania wewnętrznego: niedrożność dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenie pęcherzyka żółciowego, przewlekłe choroby wątroby, uzależnienie od alkoholu
- przeciwwskazania do stosowania zewnętrznego: uszkodzona skóra (np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych), choroby skóry przebiegające z wysypką; nie stosować na błony śluzowe oraz w okolicach oczu

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.