


APAP FORTE dla dzieci 40 mg/ml, 85 ml



cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	zawiesina
Producent	USP ZDROWIE
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

Opis produktu

APAP FORTE dla dzieci 40 mg/ml - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

APAP FORTE dla dzieci 40 mg/ml - wskazania:

- do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego ząbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym, gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej, bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych)
- do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki u dzieci o masie ciała do 40 kg (w przybliżeniu od 0 miesięcy do 12 lat), dzieci powyżej 12 lat, młodzieży i dorosłych (włączając osoby w podeszłym wieku)

APAP FORTE dla dzieci 40 mg/ml - skład:

1 ml zawiesiny zawiera 40 mg paracetamolu; pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy (aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320))

APAP FORTE dla dzieci 40 mg/ml - dawkowanie:

zalecana dawka dobową paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała/dobę, która jest podzielona na 4 do 6 dawek w ciągu doby, czyli 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny

- 0-6 miesięcy 1,5 ml maksymalnie 4 razy w ciągu 24 godzin
- 6-24 miesięcy 3 ml maksymalnie 4 razy w ciągu 24 godzin
- 2-3 lata 4,5 ml maksymalnie 4 razy w ciągu 24 godzin
- 4-6 lat 6 ml maksymalnie 4 razy w ciągu 24 godzin
- 7-9 lat 9 ml maksymalnie 4 razy w ciągu 24 godzin
- 10-12 lat 12,5 ml maksymalnie 4 razy w ciągu 24 godzin

APAP FORTE dla dzieci 40 mg/ml - przeciwwskazania:

uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.