

APAP INTENSE, 10 tabletek



cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	USP ZDROWIE
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

APAP INTENSE - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe

APAP INTENSE - wskazania:

produkt leczniczy stosowany jest w doraźnym leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych i mięśniowych, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, przeziębieniem oraz grypą, bólu gardła lub gorączki. Produkt leczniczy jest szczególnie odpowiedni do leczenia bólu wymagającego silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie.

APAP INTENSE - skład:

1 tabletkę zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 500 mg, ibuprofen (Ibuprofenum) 200 mg, substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, krospowidon (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-30, skrobia, żelowana kukurydziana, talk, kwas stearynowy, otoczkę tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E171)

APAP INTENSE - dawkowanie:

dorośli - 1 tabletkę (lub 2, jeśli to konieczne) podczas posiłku, popijając wodą, nie częściej niż 3 razy na dobę. Należy zachować co najmniej 6-godzinną przerwę między kolejnymi dawkami i nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu 24 godzin.

APAP INTENSE - przeciwwskazania:

- stwierdzona nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
- czynna lub występująca w wywiadzie nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, i (lub) krwotok z żołądka lub dwunastnicy (co najmniej)

- dwa osobne przypadki stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)
- owrzodzenie, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czynne lub w wywiadzie, łącznie z przypadkami związanymi z przyjęciem leków z grupy NLPZ
- zaburzenia krzepnięcia
- ciężka niewydolność wątroby, nerek lub ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA)
- równoczesne stosowanie z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (COX-2) oraz kwasem acetylosalicylowym w dawkach większych niż 75 mg na dobę - zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
- jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol - zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych
- ostatni trymestr ciąży - ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu i wystąpienia nadciśnienia płucnego

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.