

APAP MIGRENA, 20 tabletek



cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	USP ZDROWIE
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

APAP MIGRENA - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne; kofeina nasila przeciwbólowe działanie salicylanów i działa umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy

APAP MIGRENA - wskazania:

doraźne leczenie bólu głowy i napadów migreny z aurą lub bez aury u dorosłych

APAP MIGRENA - skład:

1 tabletkę zawiera: 250 mg paracetamolu, 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 65 mg kofeiny; substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, kwas stearynowy 50; otoczka: Forcoat White W010 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, kwas benzoesowy), wosk Carnauba.

APAP MIGRENA - dawkowanie:

dorośli - w wieku powyżej 18 lat:

- ból głowy - zazwyczaj zalecaną dawką jest 1 tabletkę. Drugą tabletkę można przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej. W przypadku bardziej nasilonego bólu głowy można przyjąć jednorazowo 2 tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin. Lek jest przeznaczony do doraźnego stosowania w bólu głowy maksymalnie do 4 dni.
- migrena: po wystąpieniu objawów należy przyjąć 2 tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin. Lek jest przeznaczony do doraźnego stosowania w migrenie, maksymalnie do 3 dni.

Zarówno w przypadku bólu głowy, jak i migreny nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

APAP MIGRENA - przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
- nie stosować u pacjentów, u których stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak diklofenak czy ibuprofen, powoduje napady astmy, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa
- czynny wrzód żołądka lub jelit, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego oraz u pacjentów z owrzodzeniem żołądka w wywiadzie
- hemofilia lub inne skazy krwotoczne
- ciężka niewydolność wątroby lub ciężkie uszkodzenie lub niewydolność nerek (GFR <30ml/min/1,73m²)
- ciężka niewydolność serca
- przyjmowanie metotreksatu w dawce większej niż 15 mg na tydzień
- trzeci trymestr ciąży

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.