

ASPIRIN C, 20 tabletek musujących



cena: 30,49 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki musujące
Producent	BAYER
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

ASPIRIN C - działanie:

- kwas acetylosalicylowy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo
- witamina C - jej dodatek jest korzystny w przebiegu chorób przeziębieniowych, podczas których występuje zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C

ASPIRIN C - wskazania:

- objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe)
- objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy

ASPIRIN C - skład:

każda tabletkę zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) i 240 mg witaminy C (Acidum ascorbicum); pozostałe składniki to: sodu cytrynian bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny

ASPIRIN C - dawkowanie:

dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek musujących. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.

młodzież w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletek na dobę.

ASPIRIN C - przeciwwskazania:

- uczulenie na substancje czynne, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- skaza krwotoczna
- ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
- ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek
- jeśli kiedykolwiek występowały u pacjenta napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- jednoczesne przyjmowanie leku metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
- ostatni trymestr ciąży
- wiek poniżej 12 lat

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.