

ASPIRIN CARDIO 100 mg, 30 tabletek



cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik	kwas acetylosalicylowy
Postać	tabletki
Producent	BAYER
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwzakrzepowe

Opis produktu

ASPIRIN CARDIO 100 mg - działanie:

przeciwzakrzepowe

ASPIRIN CARDIO 100 mg - wskazania:

do stosowania w następujących chorobach układu sercowo-naczyniowego: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przeszkońska śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylny), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki

ASPIRIN CARDIO 100 mg - skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego; pozostałe składniki to: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu, polisorbát 80, sodu laurylosiarczan, talk, cytrynian trietylu

ASPIRIN CARDIO 100 mg - dawkowanie:

w niestabilnej chorobie wieńcowej: 1 tabletkę raz na dobę; w świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca – od 2 do 3 tabletek raz na dobę, przy czym należy tabletki rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie; w profilaktyce wystąpienia powtórnego zawału serca: 1 tabletkę raz na dobę; w celu zapobiegania powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach: 1 tabletkę raz na dobę; w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA: 1 tabletkę raz na dobę; w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka: 1 tabletkę raz na dobę; w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki: od 1 do 2 tabletek raz na dobę

ASPIRIN CARDIO 100 mg - przeciwwskazania:

uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; zwiększona skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; poważne problemy z nerkami lub wątrobą (ciężka niewydolność nerek, wątroby); napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech); trzeci trymestr ciąży; stosowanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; nie stosować u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna) z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye'a)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.