

CALOMINAL DUO wspomaga leczenie nadwagi, 150 g

cena: 63,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	proszek
Producent	AFLOFARM
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Zastosowanie	redukcja wagi

Opis produktu

CALOMINAL DUO wspomaga leczenie nadwagi - działanie:

zmniejsza ilość tłuszczów i cukrów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dodatkowo zwiększa uczucie sytości oraz ogranicza ilość przyswajanego z pożywienia cholesterolu. Poprzez swoje działanie Calominal Duo wspomaga redukcję i kontrolę masy ciała

CALOMINAL DUO wspomaga leczenie nadwagi - wskazania:

redukcja i kontrola masy ciała

CALOMINAL DUO wspomaga leczenie nadwagi - skład:

glukomannan, chitozan, kwas cytrynowy, aromat multitropic, maltodekstryna DE 20, acesulfam K, sukraloza, betakaroten, sacharynian sodu

CALOMINAL DUO wspomaga leczenie nadwagi - dawkowanie:

do opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa umożliwiająca odmierzenie dawki wyrobu. 1 dawka to 2,5 g proszku

- redukcja wagi ciała - 2 razy dziennie po 2 dawki
- kontrola masy ciała - 2 razy dziennie po 1 dawce
- Odmierzoną ilość należy rozpuścić w co najmniej 250 ml wody. Energicznie wymieszać i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Wyrób należy przyjmować tylko do dwóch głównych posiłków. W czasie stosowania zaleca się przyjmowanie minimum 2-3 litrów wody dziennie

CALOMINAL DUO wspomaga leczenie nadwagi - przeciwwskazania:

- nie stosować u dzieci i młodzieży

- nie stosować w przypadku uczulenia na produkty ze skorupiaków, ryb lub mięczaków lub na którykolwiek ze składników wyrobu
- nie stosować u osób: ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) niższym niż 18,5, z dysfagią, z chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego (refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie uchyłków), z objawami niedrożności jelit, z porażeniem żołądka, z polipami jelita, z ciężką niestrawnością, z zaparciami, po operacji obojętności lub zmniejszenia żołądka. Osoby, u których występują zaburzenia trawienia lub przemiany materii oraz osoby przyjmujące leki ograniczające perystaltykę jelit powinny skonsultować z lekarzem możliwość stosowania wyrobu Calominal duo. Osoby w wieku powyżej 80 lat nie powinny odchudzać się bez zgody lekarza
- nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią
- wyrób jest barwiony betakarotenem, który jest źródłem witaminy A. Betakaroten zawarty w 4 dawkach wyrobu pokrywa ok. 116% dziennego zapotrzebowania na witaminę A. W trakcie stosowania Calominalu duo nie należy przyjmować preparatów witaminy A
- nie stosować wyrobu jednocześnie z lekami lipofilowymi (np. doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, witaminami D, E i K, niektórymi antybiotykami)
- należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin między przyjęciem leków a przyjęciem wyrobu Calominal duo
- osoby przyjmujące leki hipolipemizujące (np. statyny, fibraty) lub leki hipoglikemizujące (przeciwcukrzycowe) mogą zastosować Calominal duo tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Calominal duo nie jest zamiennikiem tych leków. Jeśli jakiegokolwiek leki są przyjmowane długotrwale przed zastosowaniem wyrobu Calominal duo należy skonsultować się z lekarzem

Dodatkowe informacje: wyrób nie ma zdolności wiązania takich składników pożywienia jak białko czy alkohol