

CALPEROS 500 wapń w kapsułkach, 30 kapsułek

cena: 17,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	TEVA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	uzupełnienie niedoboru wapnia

Opis produktu

CALPEROS 500 wapń w kapsułkach - działanie:

wapń warunkuje prawidłowe przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni poprzecznie prążkowanych. Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wpływa na sprawność pracy mięśnia sercowego. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Wpływa na aktywność szeregu enzymów, pełni też rolę przekaźnika, dzięki któremu bodźce chemiczne, fizyczne lub hormonalne ulegają przekształceniu w określony efekt biologiczny. Dzięki właściwości zmniejszania przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych wapń działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie.

CALPEROS 500 wapń w kapsułkach - wskazania:

stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń: okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji; nieprawidłowe żywienie produktami ubogimi w wapń; zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych; zmniejszone stężenie wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, poddawanych dializom i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej; profilaktycznie w zapobieganiu i uzupełniając w kompleksowym leczeniu osteoporozy; stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji po złamaniach kości; wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych

CALPEROS 500 wapń w kapsułkach - skład:

1 kapsułka twarda leku CALPEROS 500 zawiera 200 mg jonów wapnia w postaci 500 mg wapnia węglanu

CALPEROS 500 wapń w kapsułkach - dawkowanie:

młodzież i dorośli - 800-1200 mg wapnia dziennie; kobiety w ciąży i karmiące piersią – 1000-1500 mg; kobiety po menopauzie nie stosujące hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) – 1500 mg; kobiety po menopauzie stosujące HTZ – 1000 mg; wszyscy powyżej 65 r. ż. - 1500 mg

CALPEROS 500 wapń w kapsułkach - przeciwwskazania:

uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; zwiększone stężenie wapnia we krwi i nadmierne

wydalanie wapnia w moczu, np. w nadczynności tarczycy, przytarczyc, przedawkowaniu witaminy D3, nowotworach odwapniających, takich jak szpiczaki i nowotworach dających przerzuty do kości, w ciężkiej niewydolności nerek nie leczonej dializami; kamica nerkowa; leczenie glikozydami nasercowymi; ciężka hiperkalciuria (mocz z nadmierną ilością wydalanego wapnia)

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.