

DESMOXAN 1,5 mg, 100 tabletek

cena: 53,49 PLN



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	AFLOFARM
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	rzucanie palenia

Opis produktu

DESMOXAN 1,5 mg - działanie:

cytyzyna stopniowo wypiera nikotynę z organizmu. Dzięki temu zmniejsza się uzależnienie od nikotyny i możliwe jest odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji (głodu nikotynowego)

DESMOXAN 1,5 mg - wskazania:

leczenie uzależnienia od nikotyny

DESMOXAN 1,5 mg - skład:

1 kapsułka twarda zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum); pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu. Skład kapsułki twardej: tytanu dwutlenek, indygotyna, żelatyna

DESMOXAN 1,5 mg - dawkowanie:

- od 1 do 3 dnia 1 tabletkę co 2 godziny (maksymalnie 6 tabletek na dobę)
- od 4 do 12 dnia 1 tabletkę co 2,5 godziny (maksymalnie 5 tabletek na dobę)
- od 13 do 16 dnia 1 tabletkę co 3 godziny (maksymalnie 4 tabletki na dobę)
- od 17 do 20 dnia 1 tabletkę co 5 godzin (maksymalnie 3 tabletki na dobę)

Od pierwszego dnia leczenia należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów. Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeśli rezultat terapii jest niezadowolający, należy przerwać leczenie. Leczenie można rozpocząć ponownie po upływie 2 do 3 miesięcy

DESMOXAN 1,5 mg - przeciwwskazania:

- uczulenie na substancję czynną (cytyzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- niestabilna dławica piersiowa
- przebyty niedawno zawału mięśnia sercowego lub udar mózgu
- klinicznie istotne zaburzenia rytmu serca
- ciąża lub karmienie piersią