

# DIKLOFENAK 10 mg/g, żel 100 g

cena: 12,99 PLN



## Opis słownikowy

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Główny składnik    | diklofenak                                      |
| Postać             | żel                                             |
| Producent          | LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN                   |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny leczniczy                        |
| Zastosowanie       | przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne |

## Opis produktu

### DIKLOFENAK 10 mg/g - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, kojące i chłodzące

### DIKLOFENAK 10 mg/g - wskazania:

miejscowo na skórę: w pourazowych stanach zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń); w bólach pleców; w ograniczonych stanach zapalnych tkanek miękkich (takich jak zapalenie ścięgien czy łokieć tenisisty); w ograniczonych i łagodnych postaciach zapalenia stawów. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży

### DIKLOFENAK 10 mg/g - skład:

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego; pozostałe składniki: karbomer, makroglu eter cetostearylowy, dietyloamina, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła, olejek lawendowy, olejek cytrynowy, kokozyłokapryłokapronian, woda oczyszczona

### DIKLOFENAK 10 mg/g - sposób użycia:

Miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, delikatnie wcierając; ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo

### DIKLOFENAK 10 mg/g - przeciwwskazania:

uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak, glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku; występowanie w przeszłości ataków astmy (duszność), pokrzywki, czy też kataru po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofenu); wiek poniżej 12 lat; ostatni trymestr ciąży

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

