MK PHARM sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4, Golub-Dobrzyń
790 267 106

DULCOBIS 5 mg, 60 tabletek

cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	BOEHRINGER INGELHEIM
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	problemy z wypróżnianiem, przygotowanie do badań

Opis produktu

DULCOBIS 5 mg - działanie:

przeczyszczające

DULCOBIS 5 mg - wskazania:

krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć; w celu przygotowania do badań, przed operacjami i po operacjach oraz w stanach wymagających ułatwienia wypróżnienia; dla dzieci od lat 4, młodzieży i dorosłych

DULCOBIS 5 mg - skład:

1 tabletka dojelitowa zawiera 5 mg bisakodylu; pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana rozpuszczalna, glicerol 85%, magnezu stearynian, otoczka: magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E171), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:1), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2), olej rycynowy, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E172), wosk biały, wosk Carnauba, szelak
DULCOBIS 5 mg - dawkowanie:

- Krótkotrwałe leczenie zaparć: Dorośli: 1-2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) na dobę przed snem; młodzież i dzieci powyżej 10 lat: 1-2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) na dobę przed snem. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki. Dawkę można dostosować do najwyższej zalecanej dawki w celu uzyskania regularnych wypróżnień. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej; dzieci 4-10 lat: 1 tabletka dojelitowa (5 mg) na dobę przed snem. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Dzieci w wieku 10 lat i młodsze z przewlekłymi lub uporczywymi zaparciami powinny być leczone wyłącznie pod opieką lekarza. Tabletki dojelitowe należy przyjmować wieczorem, aby rano doszło do wypróżnienia. Tabletki należy połykać w całości i popijać dużą ilością wody. Tabletek nie wolno rozgryzać
- Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych

Stosować pod nadzorem personelu medycznego. Dorośli: w celu całkowitego opróżnienia jelit osoby dorosłe powinny przyjąć, zgodnie z zaleceniami lekarza, 2-4 tabletek dojelitowych (10-20 mg) wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, po czym rano w dniu badania przyjmują środek przeczyszczający o natychmiastowym działaniu (np. w postaci czopka). Dzieci powyżej 4 lat: jedna tabletka dojelitowa (5 mg) wieczorem, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast działającego środka przeczyszczającego (np. czopka).

DULCOBIS 5 mg - przeciwwskazania:

uczulenie (nadwrażliwość) na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku; niedrożność jelit, ostre stany chorobowe w jamie brzusznej, w tym zapalenie wyrostka robaczkowego lub ostre zapalne choroby jelit; utrata dużej ilości; ból brzucha połączony z nudnościami i wymiotami; dziedziczna nietolerancja niektórych cukrów; nie stosować u dzieci poniżej 4 lat

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.