

EFFERALGAN 500 mg, 16 tabletek musujących

cena: 12,99 PLN



Opis słownikowy

Główny składnik	paracetamol
Postać	tabletki musujące
Producent	BRISTOL-MYERS SQUIBB
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

Opis produktu

EFFERALGAN - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

EFFERALGAN - wskazania:

ból różnego pochodzenia (ból głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne), leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia, gorączka

EFFERALGAN - skład:

1 tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu, kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, sorbitol, sodu dokuzynian, powidon, sodu sacharynian, sodu benzoesan

EFFERALGAN - dawkowanie:

dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg (w wieku powyżej 15 lat) - zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg mc. co 4 do 6 godzin, maksymalna dawka dobową paracetamolu wynosi 75 mg/kg mc./dobę, łącznie nie może być większa niż 4 g paracetamolu na dobę. Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg mc. najlepiej co 6 do 8 godzin, maksymalna dawka dobową paracetamolu wynosi 60 mg/kg mc./dobę. Dla dzieci o masie ciała od 17 do 25 kg (w wieku od 6 do 8 lat) dawka jednorazowa wynosi 250 mg paracetamolu (pół tabletki musującej). W razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 1 g paracetamolu na dobę (2 tabletki musujące). Dla dzieci o masie ciała od 25 do 33 kg (w wieku od 8 do 10 lat) dawka jednorazowa wynosi 250 mg (pół tabletki musującej). W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4-6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 1,5 g paracetamolu na dobę (3 tabletki musujące). Dla dzieci o masie ciała od 33 do 50 kg (w wieku od 10 do 15 lat) dawka jednorazowa wynosi 500 mg (jedna tabletkę musującą), w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 godzin, nie

należy stosować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę (4 tabletki musujące). Przybliżony zakres wiekowy w zależności od masy ciała został podany tylko jako wskazówka

EFFERALGAN - przeciwwskazania:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efferalgan, u dzieci o masie ciała mniejszej niż 17 kg, u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby, jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.