

# ELOPRINE FORTE 1000 mg, 30 tabletek

cena: 32,99 PLN



## Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	POLFARMEX
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwwirusowe

## Opis produktu

### ELOPRINE FORTE 1000 mg - działanie:

przeciwwirusowe

### ELOPRINE FORTE 1000 mg - wskazania:

- wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex)

### ELOPRINE FORTE 1000 mg - skład:

jedna tabletkę zawiera 1000 mg inozyiny pranobeksu (Inosinum pranobexum): kompleksu zawierającego inozyinę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletkę zawiera 160 mg mannitolu.

### ELOPRINE FORTE 1000 mg - dawkowanie:

Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała pacjenta oraz zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dobową powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie produktu leczniczego należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

- dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę. Zazwyczaj dawka dobową wynosi 3 tabletki (3 g) w ciągu doby (czyli 1 tabletkę 3 razy na dobę). Maksymalna dawka dobową to 4 tabletki (4 g) w ciągu doby (czyli 1 tabletkę 4 razy na dobę).
- dzieci w wieku powyżej 1 roku: zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie produktu leczniczego Eloprine Forte w syropie

### ELOPRINE FORTE 1000 mg - przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- aktualnie występujący napad dny moczanej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.