

ETOPIRYNA, 10 tabletek



cena: 3,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwzapalne

Opis produktu

ETOPIRYNA - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne

ETOPIRYNA - wskazania:

w leczeniu bólów głowy oraz bólów o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego

ETOPIRYNA - skład:

1 tabletkę zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu i 50 mg kofeiny; pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana i laktosa jednowodna

ETOPIRYNA - dawkowanie:

stosowanie u dorosłych i dzieci powyżej 16 lat - od 1 do 2 tabletek jednorazowo lub w razie potrzeby tą samą dawkę co 8 godzin. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

ETOPIRYNA - przeciwwskazania:

uczulenie na kwas acetylosalicylowy, etenzamid, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs; astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej); ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) lub gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna); niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna); jednoczesne przyjmowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych - ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny; trzeci trymestr ciąży; okres karmienia piersią; nie stosować u dzieci i

młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.