

EXCEDRIN MIGRASTOP, 20 tabletek



cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	NOVARTIS
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwzapalne

Opis produktu

EXCEDRIN MIGRASTOP - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

EXCEDRIN MIGRASTOP - wskazania:

w doraźnym leczeniu bólu głowy oraz napadów migreny (objawów, takich jak: ból głowy, nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk) z aurą lub bez aury

EXCEDRIN MIGRASTOP - skład:

1 tabletkę zawiera 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny; pozostałe składniki: hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, otoczka Opadry Ys-1-7086: hypromeloza, dwutlenek tytanu (E171), glikol propylenowy, kwas benzoesowy (E210), воск Carnauba

EXCEDRIN MIGRASTOP - dawkowanie:

dorośli (powyżej 18 lat) - leczenie bólu głowy: wziąć 1 tabletkę i popić ją pełną szklanką wody, w razie konieczności kolejną tabletkę można przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej. W przypadku bardziej intensywnego bólu głowy można wziąć jednorazowo 2 tabletki, w razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin od zażycia dwóch pierwszych tabletek. Leczenie migreny - należy przyjąć 2 tabletki popijając je szklanką wody. W razie konieczności można przyjąć kolejne dwie tabletki, zachowując 4-6 godzinny odstęp między dawkami.

EXCEDRIN MIGRASTOP - przeciwwskazania:

uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek ze składników tabletek; jeśli stwierdzono kiedykolwiek reakcje alergiczne na inne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub przeciwgorączkowe, takie jak diklofenak lub ibuprofen; owrzodzenie żołądka, jelit, lub jeżeli w przeszłości występowało owrzodzenie układu pokarmowego; krew w stolcu lub czarne stolce (objawy krwawienia lub perforacji żołądkowojelitowych); hemofilia lub występowanie innych chorób krwi; ciężkie schorzeniach serca, wątroby lub nerek; jednoczesne przyjmowanie ponad 15 mg metotreksatu tygodniowo; trzeci trymestr ciąży

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.