

FITOLIZYNA, 100 g



cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	pasta
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	Lek ziołowy
Zastosowanie	zakażenia układu moczowego

Opis produktu

FITOLIZYNA - działanie:

tradycyjny lek roślinny stosowany jako środek moczopędny i przeciwzapalny. Ma postać pasty doustnej, zawierającej wyciąg złożony z: kłącza perzu, łuski cebuli, liści brzozy, nasion kozieradki, korzenia pietruszki, ziela nawłoci, ziela skrzypu, korzenia lubczyku i ziela rdestu ptasiego

FITOLIZYNA - wskazania:

stosowany pomocniczo w zakażeniach i stanach zapalnych dróg moczowych, w kamicy dróg moczowych (w drobnych złożach, tzw. piasku nerkowym) oraz profilaktycznie w kamicy nerkowej

FITOLIZYNA - skład:

substancją czynną leku jest wyciąg złożony (1:1,3-1,6) z: kłącza perzu (*Agropyri rhizomate*) 12,5 cz., łuski cebuli (*Allii cepae squama*) 5,0 cz., liści brzozy (*Betulae folio*) 10,0 cz., nasion kozieradki (*Foenugraeci semine*) 15,0 cz., korzenia pietruszki (*Petroselini radice*) 17,5 cz., ziela nawłoci (*Solidaginis herba*) 5,0 cz., ziela skrzypu (*Equiseti herba*) 10,0 cz., korzenia lubczyku (*Levistici radix*) 10,0 cz. i ziela rdestu ptasiego (*Polygoni avicularis herba*) 15,0 cz. Ekstrahent: etanol 45% (V/V). 5 g leku zawiera 3,36 g substancji czynnej

pozostałe składniki to: glicerol 99,5%, agar, olejek eteryczny miętowy, olejek eteryczny szałwii muskatołowej, olejek eteryczny pomarańczy słodkiej, olejek eteryczny sosny zwyczajnej, skrobia pszeniczna, wanilina, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), woda oczyszczona

lek zawiera do 4% (V/V) etanolu

FITOLIZYNA - dawkowanie:

- dorośli: 1 łyżeczkę (około 5 g) pasty rozpuścić w ½ szklanki ciepłej przegotowanej wody, pić 3-4 razy na dobę
- dzieci i młodzież - stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane
- bez konsultacji z lekarzem nie zaleca się stosowania dłużej niż 2-4 tygodnie

FITOLIZYNA - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancję czynną lub na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae), z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae dawniej Umbelliferae), anetol lub na alergeny pyłku brzozy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
nie stosować w razie konieczności zmniejszenia ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.