

FLAVAMED MAX 30 mg/5 ml, 100 ml

cena: 14,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	BERLIN-CHEMIE
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	wykrztuśne

Opis produktu

FLAVAMED MAX 30 mg/5 ml - działanie:

wykrztuśne

FLAVAMED MAX 30 mg/5 ml - wskazania:

w leczeniu mokrego kaszlu związanego z chorobami płuc i oskrzeli

FLAVAMED MAX 30 mg/5 ml - skład:

1 ml roztworu doustnego zawiera 6 mg ambroksolu chlorowodorku. Każda łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Pozostałe substancje pomocnicze to: sorbitol ciekły niekrystalizujący (E 420), kwas benzoesowy (E 210), glicerol (85%) (E 422), hydroksyetyloceluloza, aromat malinowy (zawierający olejek walerianowy, octan etylu, maślan etylu, p-hydroksyfenylo-butanon, jonon alfa, octan izoamylu, maślan izoamylu, olejek różany i glikol 1,2-propylenowy (E 1520)), woda oczyszczona.

FLAVAMED MAX 30 mg/5 ml - dawkowanie:

- dzieci w wieku 2 do 5 lat:

¼ łyżki miarowej, tzn. 1,25 ml roztworu doustnego 3 razy na dobę (co odpowiada 22,5 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę podawanych w trzech dawkach po 7,5 mg)

- dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

½ łyżki miarowej, tzn. 2,5 ml roztworu doustnego 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 30-45 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę podawanych w dwóch do trzech dawkach po 15 mg)

- młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli:

1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni (co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę podawanych w trzech dawkach po 30 mg), a następnie 1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego 2 razy na dobę (co odpowiada 60 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę podawanych w dwóch dawkach po 30 mg).

Uwaga: jeżeli to konieczne, u dorosłych można zwiększyć dawkę do 2 łyżek miarowych każda po 5 ml roztworu doustnego dwa razy na dobę, w celu osiągnięcia lepszego efektu (co odpowiada 120 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę podawanych w dwóch dawkach po 60 mg).

FLAVAMED MAX 30 mg/5 ml - przeciwwskazania:

uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.