

IBUFEN BABY 60 mg, 5 czopków



cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	czopki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

IBUFEN BABY 60 mg, 5 czopków - działanie:

przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne

IBUFEN BABY 60 mg, 5 czopków - wskazania:

gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego); bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni towarzyszące przeziębieniu i grypie, bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle zębów, w tym bóle na skutek ząbkowania, bóle głowy, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego

IBUFEN BABY 60 mg, 5 czopków - skład:

każdy czopek zawiera 60 mg ibuprofenu; pozostałe składniki to: Witepsol H 15, Witepsol W 45

IBUFEN BABY 60 mg, 5 czopków - dawkowanie:

od 3 do 9 miesięcy (od 6 do 8 kg) 1 czopek 60 mg 3 razy na dobę, w odstępach co 6 do 8 godzin. Nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu doby. Od 9 miesięcy do 2 lat (od 8 do 12 kg) 1 czopek 60 mg 4 razy na dobę, w odstępach co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu doby.

IBUFEN BABY 60 mg, 5 czopków - przeciwwskazania:

uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); występowanie w przeszłości objawów alergii w postaci kataru (nieżyty nosa), obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy oskrzelowej po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub przebyta, lub nawracające owrzodzenie lub krwawienie z przewodu pokarmowego w przeszłości (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); występowanie krwawienia z górnego odcinka przewodu

pokarmowego lub perforacja po zastosowaniu NLPZ; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca; III trymestr ciąży; skaza krwotoczna; wiek poniżej 3. miesiąca; waga poniżej 6 kg

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.