

IBUFEN JUNIOR 200 mg, 10 kapsułek



cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	kapsułki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przecibólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

IBUFEN JUNIOR - działanie:

przecibólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

IBUFEN JUNIOR - wskazania:

bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (również migrenowe); bóle zębów; bóle mięśniowe, stawowe i kostne; bóle po urazach; nerwbóle; bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie; bolesne miesiączkowanie; bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego; stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych)

IBUFEN JUNIOR - skład:

1 kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu, makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona; osłonka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący, maltitol ciekły, woda oczyszczona

IBUFEN JUNIOR - dawkowanie:

dzieci od 6 do 9 lat (20-29 kg) - dawka początkowa 1 kapsułka, w razie potrzeby 1 kapsułka co 8 godzin (maksymalna dawka dobową wynosi 3 kapsułki - 600 mg ibuprofenu); dzieci od 10 do 12 lat (30-39 kg) - dawka początkowa 1 kapsułka, w razie potrzeby 1 kapsułka co 6 godzin (maksymalna dawka dobową wynosi 4 kapsułki - 800 mg ibuprofenu); dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): dawka początkowa od 1 do 2 kapsułek, w razie potrzeby 1 (200 mg) do 2 (400 mg) kapsułek co 4 (dla dawki 200 mg) do 6 godzin (dla dawki 400 mg) (maksymalna dawka dobową wynosi 6 kapsułek - 1200 mg ibuprofenu).

IBUFEN JUNIOR - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek ze składników leku; występowanie w przeszłości duszności, astmy, nieżytu nosa, obrzęku lub pokrzywki podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ); owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie; występowanie krwawienia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne); niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; ostatni trymestr ciąży; masa ciała poniżej 20 kg

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.