

IBUM EXPRESS 400 mg, 24 kapsułki



cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	kapsułki
Producent	HASCO-LEK
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

IBUM EXPRESS - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

IBUM EXPRESS - wskazania:

bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (w tym także migreny), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie; bolesne miesiączkowanie; stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych)

IBUM EXPRESS - skład:

1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu; pozostałe składniki: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, żółcień chinolinowa E 104, błękit patentowy E 131

IBUM EXPRESS - dawkowanie:

dorośli i dzieci powyżej 12 lat - dawka początkowa to 1 kapsułka (400 mg), w razie potrzeby 1 kapsułka co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg (3 kapsułki) na dobę.

IBUM EXPRESS - przeciwwskazania:

uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja (przedziurawienie) lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ; wystąpienie w przeszłości objawów alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi; przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX-2, takich jak celekoksyb lub etorykoksyb); ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne krwawienie; zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna (skłonność do krwawień) lub

zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu; odwodnienie wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów; wiek poniżej 12 lat

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.