

IBUM FORTE 200 mg/5 ml smak malinowy, 100 g

cena: 21,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	zawiesina
Producent	HASCO-LEK
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

IBUM FORTE - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

IBUM FORTE - wskazania:

- gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego
- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak: bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego

IBUM FORTE - skład:

5 ml zawiera 200 mg ibuprofenu; substancje pomocnicze: maltitol ciekły, glicerol, guma, ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoosan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat malinowy, woda oczyszczona

IBUM FORTE - dawkowanie:

- dzieci w wieku 3-6 miesięcy (5-7,6 kg): 1,25 ml maksymalnie 3 razy na dobę (co odpowiada maksymalnej dawce dobowej 150 mg)
- dzieci w wieku 6-12 miesięcy (7,7-9 kg): 1,25 ml maksymalnie 3-4 razy na dobę (co odpowiada maksymalnej dawce dobowej 150-200 mg)
- dzieci w wieku 1-3 lat (10-15 kg): 2,5 ml maksymalnie 3 razy na dobę (co odpowiada maksymalnej dawce dobowej 300 mg)

- dzieci w wieku 4-6 lat (16-20 kg): 3,75 ml maksymalnie 3 razy na dobę (co odpowiada maksymalnej dawce dobowej 450 mg)
- dzieci w wieku 7-9 lat (21-29 kg): 5 ml maksymalnie 3 razy na dobę (co odpowiada maksymalnej dawce dobowej 600 mg)
- dzieci w wieku 10-12 lat (30-40 kg): 7,5 ml maksymalnie 3 razy na dobę (co odpowiada maksymalnej dawce dobowej 900 mg)
- dzieci powyżej 12 lat (powyżej 40 kg): 7,5 ml maksymalnie 3-4 razy na dobę (co odpowiada maksymalnej dawce dobowej 900-1200 mg)

IBUM FORTE - przeciwwskazania:

- uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ
- u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości jakiegokolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej
- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca
- jeśli występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie
- zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu
- stwierdzoną nietolerancję niektórych cukrów

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.