

IBUPROM 200 mg, 50 tabletek



cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	tabletki
Producent	US PHARMACIA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

IBUPROM - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe

IBUPROM - wskazania:

dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe; bolesne miesiączkowanie; gorączka (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych)

IBUPROM - skład:

1 tabletki zawiera 200 mg ibuprofenu; pozostałe składniki: rdzeń tabletki - celuloza proszek, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, guma Guar, talk, krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna uwodniona, olej roślinny utwardzony; skład otoczki -hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, talk, żelatyna, sacharoza, kaolin, cukier konfekcyjony (mieszanina sacharozy i skrobi kukurydzianej), węglan wapnia, guma akacjowa, tytanu dwutlenek (E 171), barwnik biały - Opalux White AS 7000, wosk Carnauba, tusz czarny - Opacode Black S-1-17823

IBUPROM - dawkowanie:

dzieci od 6 do 9 lat (masa ciała 20-29 kg) - w doraźnym leczeniu 1 tabletki doustnie co 6-8 godzin, po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę (maksymalna dawka dobową 600 mg w dawkach podzielonych). Dzieci od 10 do 12 lat (masa ciała 30-39 kg) - w doraźnym leczeniu 1 tabletki doustnie co 6 godzin, po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 4 tabletki na dobę (maksymalna dawka dobową 800 mg w dawkach podzielonych). Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - w doraźnym leczeniu 1 do 2 tabletek doustnie co 4 godziny, po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobową 1200 mg w dawkach podzielonych).

IBUPROM - przeciwwskazania:

uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ; wystąpienie w przeszłości reakcji alergicznej w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi; ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca; jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); ostatni trymestr ciąży; skaza krwotoczna; wiek poniżej 6 lat

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.