

## IBUPROM RR MAX 400 mg, 24 tabletki

cena: 17,99 PLN



### Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	tabletki
Producent	US PHARMACIA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

### Opis produktu

#### IBUPROM RR MAX - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe

#### IBUPROM RR MAX - wskazania:

bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, migrena, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe, nerwobóle; bolesne miesiączkowanie; gorączka (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych)

#### IBUPROM RR MAX - skład:

1 tabletki zawiera 400 mg ibuprofenu; substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, olej uwodniony, roślinny, krospowidon, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, Opadry White 65F280000 o składzie: alkohol poliwinylowy (E 1203), makrogol 3350 (E1521), tytanu dwutlenek (E171), talk (E553b), mieszanina glinu potasu krzemianu (E555) i tytanu dwutlenku (E171), воск Carnauba, szelak glazura ok. 45% (20% estryfikowana) w etanolu, tytanu dwutlenek (E171), alkohol n-butyłowy, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy (E1520), alkohol izopropylowy, amonowy wodorotlenek 28% (E527), symetykon

#### IBUPROM RR MAX - dawkowanie:

dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 1 tabletki doustnie co 4-6 godzin, po posiłkach. Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę (maksymalna dawka dobową 1200 mg w dawkach podzielonych).

#### IBUPROM RR MAX - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na ibuprofen lub którykolwiek ze składników leku; występowanie w przeszłości duszności, astmy, nieżytu nosa, obrzęku lub pokrzywki podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ); owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie; występowanie krwawienia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne); niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; ostatni trymestr ciąży; wiek poniżej 12 lat

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.