

IBUPROM ULTRAMAX 600 mg, 10 tabletek



cena: 14,49 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	USP ZDROWIE
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

IBUPROM ULTRAMAX 600 mg - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

IBUPROM ULTRAMAX 600 mg - wskazania:

doraźnie, u dorosłych w ostrych, umiarkowanych bólach różnego pochodzenia, takich jak: bóle głowy (w tym także migreny), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne (w tym także bóle pleców), bóle pourazowe, pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie

IBUPROM ULTRAMAX 600 mg - skład:

1 tabletka powlekana zawiera 600 mg ibuprofenu; substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), tytanu dwutlenek (E 171), talk i glikol propylenowy

IBUPROM ULTRAMAX 600 mg - dawkowanie:

dorośli - 1 tabletka powlekana, jeśli jest to niezbędne to kolejną można zastosować po 6-8 godzinach. Maksymalna dawka dobową bez konsultacji z lekarzem wynosi 2 tabletki. Lek należy stosować po 6-8 godzinach, jeśli mniejsze dawki ibuprofenu (400 mg) nie zmniejszają bólu.

IBUPROM ULTRAMAX 600 mg - przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub

pokrzywka) związane z zastosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w wywiadzie

- ciężka niewydolność serca (klasa IV według NYHA)
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
- niewyjaśnione zaburzenia krwiotworzenia
- krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie
- krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie przyjmowania NLPZ w wywiadzie
- czynna lub w wywiadzie nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub krwotoki z przewodu pokarmowego (co najmniej dwa oddzielne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)
- ciężkie odwodnienie (wywołane przez wymioty, biegunkę lub przyjmowanie niewystarczających ilości płynów)
- ostatni trymestr ciąży
- wiek poniżej 18 lat

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.