

IBUVIT D3 2000 IU, 30 kapsułek



cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	leczenie niedoboru witaminy D3

Opis produktu

IBUVIT D3 2000 IU - działanie:

witamina D zwiększa wchłanianie wapnia z jelit i zmniejsza jego wydalanie przez nerki, co wspomaga budowę kości. Niedobór witaminy D jest przyczyną krzywicy (zaburzonej mineralizacji kości u dzieci) oraz osteomalacji (nieodstatecznej mineralizacji kości u dorosłych).

IBUVIT D3 2000 IU - wskazania:

- profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. krzywica, osteomalacja) u dorosłych z prawidłową masą ciała oraz dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej
- leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych
- profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem

IBUVIT D3 2000 IU - skład:

każda kapsułka zawiera 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2000 IU witaminy D; pozostałe składniki to: zawartość kapsułki - olej krokoszowy oczyszczony, skład otoczki kapsułki - żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

IBUVIT D3 2000 IU - dawkowanie:

- profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 11 lat i powyżej - zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę u pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich
- leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych - zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku
- profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem - zazwyczaj zalecana dawka to 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku, chyba że lekarz zaleci inny sposób

dawkowania

Nie należy stosować innych leków, suplementów diety ani pokarmów zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriolu lub innych metabolitów i analogów witaminy D bez nadzoru lekarza.

IBUVIT D3 2000 IU - przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria
- kamica nerkowa i (lub) nefrokalcynoza
- ciężka niewydolność nerek
- hiperwitaminoza D
- wiek poniżej 11 lat

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.