

## IBUVIT D3 2000 IU, 90 kapsułek



cena: 26,49 PLN

### Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	leczenie niedoboru witaminy D3

### Opis produktu

#### IBUVIT D3 2000 IU - działanie:

witamina D zwiększa wchłanianie wapnia z jelit i zmniejsza jego wydalanie przez nerki, co wspomaga budowę kości. Niedobór witaminy D jest przyczyną krzywicy (zaburzonej mineralizacji kości u dzieci) oraz osteomalacji (nieodstatecznej mineralizacji kości u dorosłych).

#### IBUVIT D3 2000 IU - wskazania:

- profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. krzywica, osteomalacja) u dorosłych z prawidłową masą ciała oraz dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej
- leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych
- profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem

#### IBUVIT D3 2000 IU - skład:

każda kapsułka zawiera 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2000 IU witaminy D; pozostałe składniki to: zawartość kapsułki - olej krokoszowy oczyszczony, skład otoczki kapsułki - żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

#### IBUVIT D3 2000 IU - dawkowanie:

- profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 11 lat i powyżej - zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę u pacjentów z prawidłową masą ciała, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich
- leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych - zazwyczaj 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku
- profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem - zazwyczaj zalecana dawka to 2000 IU (1 kapsułka) na dobę, niezależnie od pory roku, chyba że lekarz zaleci inny sposób

#### dawkowania

Nie należy stosować innych leków, suplementów diety ani pokarmów zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriolu lub innych metabolitów i analogów witaminy D bez nadzoru lekarza.

#### **IBUVIT D3 2000 IU - przeciwwskazania:**

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria
- kamica nerkowa i (lub) nefrokalcynoza
- ciężka niewydolność nerek
- hiperwitaminoza D
- wiek poniżej 11 lat

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.