

INVAG, 7 kapsułek dopochwowych



cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	BIOMED
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	odbudowa flory bakteryjnej

Opis produktu

Uwaga: produkt dostępny tylko przy odbiorze własnym w aptece.

INVAG - działanie:

przywrócenie lub uzupełnienie flory bakteryjnej pochwy i utrzymanie właściwego pH pochwy

INVAG - wskazania:

zapobieganie infekcjom układu moczowo-płciowego:

- w trakcie i po leczeniu antybiotykami i innymi lekami przeciwbakteryjnymi oraz przeciwgrzybiczymi i przeciwprzespiskowymi i przeciwgrzybiczymi
- w okresie klimakterium oraz po poronieniu
- profilaktycznie we wszelkich sytuacjach, w których dochodzi do zaburzenia równowagi flory pochwy (np. niewłaściwe przyzwyczajenia higieniczne, antykoncepcja)
- wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych pochwy (zakażenia pochwy), w trakcie i po leczeniu antybiotykami, innymi lekami przeciwbakteryjnymi i (lub) przeciwgrzybiczymi (w tym również podczas leczenia upławów)

INVAG - skład:

każda kapsułka zawiera nie mniej niż 10^9 CFU (Jednostek tworzących kolonie) bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus gasseri 57C; substancje pomocnicze: odtłuszczone mleko w proszku, sacharoza, sodu L-glutaminian, mannitol, laktoza jednowodna, magnezu stearynian; składniki kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek

INVAG - dawkowanie:

1 kapsułka na noc przez 1 tydzień. W razie potrzeby leczenie należy powtórzyć. Kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej.

INVAG - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.