

KETONAL SPRINT MAX 50 mg, 12 saszetek

cena: 19,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	saszetki
Producent	SANDOZ
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

KETONAL SPRINT MAX 50 mg - działanie:

przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

KETONAL SPRINT MAX 50 mg - wskazania:

u dorosłych i u młodzieży w wieku 16 lat lub starszej
w krótkotrwałym objawowym leczeniu lekkiego lub umiarkowanego ostrego bólu, takiego jak:

- ból głowy
- bóle zębów
- bolesne miesiączkowanie
- ból spowodowany lekkimi nadwyrężeniami i zwichnięciami

KETONAL SPRINT MAX 50 mg - skład:

każda saszетка zawiera 50 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (80 mg); pozostałe składniki to: mannitol (E 421), powidon K30, aromat miętowy (zawiera maltodekstrynę i gumę arabską), sodu chlorek, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna

KETONAL SPRINT MAX 50 mg - dawkowanie:

dorośli i młodzież w wieku 16 lat i więcej - pół dwudzielnej saszetki do trzech razy na dobę lub jedna cała dwudzielna saszетка do dwóch razy na dobę. Między kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 8-godzinną przerwę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

KETONAL SPRINT MAX 50 mg - przeciwwskazania:

- uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

- wystąpienie w przeszłości reakcji alergicznej po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub leku przeciwbólowego, np. ketoprofenu, ibuprofenu albo diklofenaku, takiej jak: napad astmy, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, pokrzywka, świąd nosa i wodnisty wyciek z nosa, innego rodzaju reakcje alergiczne. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem, reakcje alergiczne.
- astma
- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy albo występowanie w przeszłości krwawienia z przewodu pokarmowego; owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego
- choroba przewodu pokarmowego, taka jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna
- ciężka niewydolność serca
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
- skłonność do krwawień
- trzecim trymestr ciąży

Leku Ketonal Sprint Max nie należy stosować bez wyraźnego zalecenia lekarza, jeśli u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko powikłań dotyczących żołądka, np. jeśli pacjent jest w podeszłym wieku albo przyjmuje niektóre inne leki, takie jak leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwplatekcyjne, kortykosteroidy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny (tzw. SSRI).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.