

MAGLEK B6, 50 tabletek

cena: 13,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	LEKAM
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	uzupełnienie magnezu

Opis produktu

MAGLEK B6 - działanie:

uzupełnienie diety w magnez i witaminę B6

MAGLEK B6 - wskazania:

profilaktycznie w sytuacjach powodujących niedobory magnezu: stany przewlekłego przemęczenia fizycznego i psychicznego, błędy żywieniowe (spożywanie dużej ilości przetworzonej żywności) oraz stosowanie diet odchudzających, spożywanie dużej ilości kawy, nałogowe palenie tytoniu i spożywanie alkoholu, długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych i niektórych preparatów moczopędnych oraz diureza osmotyczna u chorych na cukrzycę w przebiegu przewlekłej hiperglikemii, choroby przewlekłe powodujące upośledzenie wchłaniania (zespoły złego wchłaniania), w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca. Wspomagająco produkt leczniczy może być stosowany po konsultacji z lekarzem jako uzupełnienie leczenia: chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca; atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn; w stanach depresji nerwowej; podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

MAGLEK B6 - skład:

magnezu mleczan w ilości 500 mg (51 mg Mg²⁺) i pirydoksyny chlorowodorek (wit. B6, w ilości 5 mg w jednej tabletkce), celuloza mikrokryształiczna, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

MAGLEK B6 - dawkowanie:

lek przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Profilaktycznie stosować 1 do 2 tabletek na dobę.

MAGLEK B6 - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.