MK PHARM sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4, Golub-Dobrzyń
790 267 106

MAGNE B6 FORTE, 60 tabletek

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	SANOFI-AVENTIS
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	uzupełnienie magnezu

Opis produktu

MAGNE B6 FORTE - działanie:

lek uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie. Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym stopień wchłaniania zależy od jego zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%

MAGNE B6 FORTE - wskazania:

nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek

MAGNE B6 FORTE - skład:

1 tabletka zawiera: jony magnezu (w postaci magnezu cytrynianu) 100 mg, pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 10 mg; substancje pomocnicze: laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian; skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk

MAGNE B6 FORTE - dawkowanie:

dorośli - 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych; przyjmować podczas posiłku. Młodzież i dzieci w wieku 6 lat lub

powyżej (o masie ciała ok. 20 kg): 10 do 30 mg/kg m.c. na dobę, tzn. 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych; przyjmować podczas posiłków.

MAGNE B6 FORTE - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku; wiek poniżej 6 roku życia; w przypadku jednoczesnego doustnego stosowania antybiotyku z grupy tetracyklin i leku Magne B6 Forte, należy zachować 3-godzinny odstęp między ich przyjmowaniem; nie stosować podczas leczenia lewodopą, gdyż pirydoksyna osłabia jej działanie

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.