

MEL 7,5 mg, 10 tabletek



cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik	meloksykam
Postać	tabletki
Producent	HASCO-LEK
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

MEL 7,5 mg - działanie:

przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

MEL 7,5 mg - wskazania:

do stosowania w bólach kostno-stawowych i mięśniowych, w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów; w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa

MEL 7,5 mg - skład:

1 tabletkę zawiera 7,5 mg meloksykamu; pozostałe składniki: betadeks, aromat malinowy SD0621M, aromat truskawkowy SD1634, aromat waniliowy SD1333, sodu cytrynian bezwodny, aspartam (E 951), Pearlitol Flash (d-mannitol, skrobia kukurydziana, woda oczyszczona), Ludiflash (octan poliwinylu, powidon K30, krospowidon (typ B), d-mannitol, woda oczyszczona), krospowidon (typ B), sodu stearylofumarany, acesulfam potasowy (E 950)

MEL 7,5 mg - dawkowanie:

1 tabletkę na dobę

MEL 7,5 mg - przeciwwskazania:

uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ostatni trymestr ciąży i okres karmienia piersią; wiek poniżej 15 lat; uczulenie na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), wystąpienie jakiegokolwiek z poniższych objawów po zastosowaniu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ): świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność (astma); niedrożność nosa z powodu obrzęku błony śluzowej nosa (polipy nosa); wysypka skórna (pokrzywka); nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący ewentualnie

utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy); wystąpienie, po wcześniejszym leczeniu NLPZ, krwawienia z żołądka lub jelit, perforacji żołądka lub jelit; choroba wrzodowa lub krwawienie z żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie; przebiecie choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, wystąpienie krwawienia z przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa lub krwawienia występujące co najmniej dwa razy); ciężkie zaburzenia czynności wątroby; ciężka niewydolność nerek; krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych); jakiegokolwiek inne krwawienia; ciężka niewydolność serca

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.