

MEL MAX ACTIGEL 20 mg/g, żel 100 g

cena: 22,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	żel
Producent	HASCO-LEK
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne

Opis produktu

MEL MAX ACTIGEL 20 mg/g żel - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe

MEL MAX ACTIGEL 20 mg/g żel - wskazania:

- dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat - miejscowe leczenie pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwreżeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe
- dorośli (w wieku powyżej 18 lat) - miejscowe leczenie ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

MEL MAX ACTIGEL 20 mg/g żel - skład:

1 gram żelu zawiera 20 mg diklofenaku sodowego; pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła, kokozylokaprylokapronian, kopolimer akryloildimetylotaurynianu amonu i Nwinylopirolidonu, makroglu eter cetostearylowy, sorbitanu trioleinian, kompozycja zapachowa Dovenia KD1710/L (zawiera między innymi: aldehyd heksylocynamonowy, alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, cytronelloł, eugenol, kumarynę, linalol, salicylan benzylu oraz 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on), woda oczyszczona

MEL MAX ACTIGEL 20 mg/g żel - sposób użycia:

należy delikatnie wcierać niewielką ilość żelu w bolące lub spuchnięte miejsca. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: wystarczająca jest ilość żelu odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego. Podczas wcierania żelu odczuwalny jest delikatny efekt chłodzący. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba że to właśnie one są miejscem

leczonym.

MEL MAX ACTIGEL 20 mg/g żel - przeciwwskazania:

- uczulenie na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- pojawienie się objawów reakcji alergicznej, wywołanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne, takich jak: śapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna z pęcherzami lub pokrzywka, obrzęk twarzy lub języka, zapalenie błony śluzowej nosa (katar),
- trzeci trymestr ciąży
- dzieci i młodzież w wieku poniżej 14 lat

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.