

METAFEN, 20 tabletek



cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen+paracetamol
Postać	tabletki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

METAFEN - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

METAFEN - wskazania:

góle różnego pochodzenia, w tym: bóle głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, bóle kości i stawów, bóle lędźwiowo-krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle; gorączka

METAFEN - skład:

1 tabletkę zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu; substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian

METAFEN - dawkowanie:

dorośli - jednorazowo 1 lub 2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę. młodzież w wieku powyżej 12 lat - jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

METAFEN - przeciwwskazania:

uczulenie na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku; uczulenie na leki z grupy NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych, charakteryzującej się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżyty błony śluzowej nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ; ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w przeszłości); perforacje lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu leków z grupy NLPZ; ciężkie nadciśnienie tętnicze; ciężka choroba układu sercowo-naczyniowego, tachykardia

(przyspieszonej akcji serca), dławica piersiowa; ciężka niewydolność serca; okres ciąży i karmienia piersią; jednoczesne przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych oraz skaza krwotoczna (skłonności do krwawień w obrębie, np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego); zatrzymanie moczu; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, wiek poniżej 12 lat; choroba alkoholowa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.