

## MIG FORTE DLA DZIECI 40 mg/ml, 100 ml

cena: 22,99 PLN



### Opis słownikowy

Postać	zawiesina
Producent	BERLIN-CHEMIE
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

### Opis produktu

#### MIG FORTE DLA DZIECI 40 mg/ml - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

#### MIG FORTE DLA DZIECI 40 mg/ml - wskazania:

do krótkotrwałego leczenia objawowego:

- bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu
- gorączki

#### MIG FORTE DLA DZIECI 40 mg/ml - skład:

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu; pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, sodu chlorek, hypromeloza 15 cP, guma ksantan, maltitol ciekły (E 965), glicerol, taumatyna (E 957), aromat truskawkowy (substancje identyczne z naturalnymi aromatami, naturalne aromaty, maltodekstryna, cytrynian trietylu, glikol propylenowy i alkohol benzyloowy), woda oczyszczona

#### MIG FORTE DLA DZIECI 40 mg/ml - dawkowanie:

- 10-15 kg (dzieci w wieku 1 rok do 3 lat) - dawka jednorazowa 100 mg ibuprofenu (co odpowiada 2,5 ml zawiesiny), całkowita dawka dobową 300 mg ibuprofenu (co odpowiada 7,5 ml zawiesiny)
- 16-19 kg (dzieci w wieku 4 do 5 lat) - dawka jednorazowa 150 mg ibuprofenu (co odpowiada 3,75 ml zawiesiny), całkowita dawka dobową 450 mg ibuprofenu (co odpowiada 11,25 ml zawiesiny)

- 20-29 kg (dzieci w wieku 6 do 9 lat) - dawka jednorazowa 200 mg ibuprofenu (co odpowiada 5 ml zawiesiny), całkowita dawka dobową 600 mg ibuprofenu (co odpowiada 15 ml zawiesiny)
- 30-39 kg (dzieci w wieku 10 do 11 lat) - dawka jednorazowa 200 mg ibuprofenu (co odpowiada 5 ml zawiesiny), całkowita dawka dobową 800 mg ibuprofenu (co odpowiada 20 ml zawiesiny)
- $\geq 40$  kg (młodzież od 12 lat i dorośli) - dawka jednorazowa 200-400 mg ibuprofenu (co odpowiada 5-10 ml zawiesiny), całkowita dawka dobową 1200 mg ibuprofenu (co odpowiada 30 ml zawiesiny)

### **MIG FORTE DLA DZIECI 40 mg/ml - przeciwwskazania:**

- uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- wystąpienie kiedykolwiek w przeszłości skurczu oskrzeli, napadu astmy oskrzelowej, obrzęku błony śluzowej nosa (nieżyt nosa), obrzęku naczynioruchowego lub reakcji skórnej (pokrzywka) w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
- zaburzenia krwiotworzenia o niewyjaśnionej przyczynie.
- wystąpienie kiedykolwiek w przeszłości krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w związku z uprzednio stosowanymi NLPZ
- czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzody trawienne) lub krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej)
- oddzielne epizody stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)
- krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie
- ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca
- ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów)
- ostatni trymestr ciąży

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.