

MUKOLINA 50 mg/ml, 120 ml



cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	TEVA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	wykrztuśne

Opis produktu

MUKOLINA - działanie:

zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzeli dzięki czemu jest ona bardziej płynna (działanie mukolityczne), co ułatwia odkrztuszanie i zmniejsza częstość napadów kaszlu

MUKOLINA - wskazania:

w leczeniu objawowym chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny

MUKOLINA - skład:

5 ml syropu zawiera 250 mg karbocysteiny; pozostałe składniki to: sorbitol ciekły krystalizujący 70% (E 420), glicerol (E 422), sodu wodorotlenek (E 524), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), karmel sproszkowany, aromat bananowy, woda oczyszczona

MUKOLINA - dawkowanie:

- dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: początkowo należy stosować dawkę 750 mg (15 ml syropu) 3 razy na dobę, a następnie po uzyskaniu korzystnego działania (rozrzedzenie wydzieliny, ułatwienie odkrztuszania) dawkę należy zmniejszyć do 500 mg (10 ml syropu) 3 razy na dobę.
- dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 250 mg (5 ml syropu) 3 razy na dobę

U dzieci i młodzieży dawka dobową karbocysteiny nie może być większa niż 30 mg/kg masy ciała. Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę leku wodą.

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni. Nie zaleca się zażywać leku przed snem.

MUKOLINA - przeciwwskazania:

- uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
- stan astmatyczny
- wiek poniżej 6 lat

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.