

## NIQUITIN 21 mg/24 godz., 7 plastrów



cena: 63,99 PLN

### Opis słownikowy

Postać	plastry
Producent	OMEGA PHARMA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Zastosowanie	rzucanie palenia

### Opis produktu

#### NIQUITIN 21 mg/24 godz. - działanie:

lek ułatwiający odzwyczajanie się od palenia tytoniu. Przez całą dobę dostarcza organizmowi stałą dawkę nikotyny. W trakcie dziesięcio- lub ośmiotygodniowego leczenia stopniowo zmniejsza się zapotrzebowanie organizmu na nikotynę. Umożliwia to zmniejszanie dawek nikotyny w trakcie kuracji, co prowadzi do stopniowego uwolnienia się od nałogu.

#### NIQUITIN 21 mg/24 godz. - wskazania:

do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (ból głowy, ból mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu

#### NIQUITIN 21 mg/24 godz. - skład:

substancją czynną leku jest nikotyna; pozostałe składniki to: kopolimer etylenowinylooctanu, wielowarstwowy laminat (barwiony średniej gęstości polietylen/ aluminium/ polietylenu tereftalan/ etylenowinylooctan), wysokiej gęstości film polietylenowy, lepki laminat poliizobutylenowy, film poliestrowy, brązowy atrament

#### NIQUITIN 21 mg/24 godz. - dawkowanie:

przed rozpoczęciem kuracji należy zaprzestać palenia tytoniu. Palenie nawet niewielkiej ilości tytoniu podczas próby zerwania z nałogiem może doprowadzić do jego nawrotu. Podczas trwania terapii nie należy palić papierosów ani przyjmować nikotyny w innej postaci, np. gumy do żucia z nikotyną, ponieważ może to spowodować przedawkowanie nikotyny. Plaster należy stosować raz na dobę. Osoby palące więcej niż 10 papierosów dziennie powinny przestrzegać trójstopniowego schematu dawkowania: w początkowym okresie kuracji (6 tygodni) plaster 21 mg/24 godz., następnie przez 2 tygodnie plaster 14 mg/24 godz. a na kolejne 2 tygodnie plaster 7 mg/24 godz.

#### NIQUITIN 21 mg/24 godz. - przeciwwskazania:

uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku  
nie stosować u dzieci