

NUROFEN 200 mg, 12 tabletek

cena: 9,49 PLN



Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	tabletki
Producent	RECKITT BENCKISER
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

NUROFEN - działanie:

przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

NUROFEN - wskazania:

bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (ból głowy, m. in. ból napięciowy i migrena; bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu), gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych), bolesne miesiączkowanie

NUROFEN - skład:

1 tabletkę zawiera 200 mg ibuprofenu; substancje pomocnicze: rdzeń tabletki - kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna; otoczka cukrowa - karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000; tusz do nadruku - Opacode S-1-277001 (szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy)

NUROFEN - dawkowanie:

dzieci od 6 do 9 lat (20 do 30 kg) - 1 tabletkę 200 mg, w razie potrzeby 1 tabletkę co 6 godzin (nie należy przekraczać dawki 3 tabletki/dobę - 600 mg). dzieci od 9 do 12 lat (30 do 40 kg) - 1 tabletkę 200 mg, w razie potrzeby 1 tabletkę co 4 do 6 godzin (nie należy przekraczać dawki 4 tabletki/dobę - 800 mg). Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (powyżej 40 kg) - dawka początkowa 2 tabletki, następnie w razie potrzeby 1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godzin (nie stosować więcej niż 6 tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby).

NUROFEN - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); wystąpienie kiedykolwiek w przeszłości objawów alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, w tym wywołane stosowaniem NLPZ; ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca; jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); III trymestr ciąży; skaza krwotoczna

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.