

NUROFEN DLA DZIECI 125 mg, 10 czopków

cena: 22,49 PLN



Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	czopki
Producent	RECKITT BENCKISER
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

NUROFEN DLA DZIECI 125 mg - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

NUROFEN DLA DZIECI 125 mg - wskazania:

leczenie bólów o nasileniu słabym do umiarkowanego, jak np. bóle w trakcie ząbkowania i bóle zębów, bóle głowy, bóle uszu, bóle gardła, bóle pooperacyjne, bóle na skutek uszkodzenia tkanek miękkich i gorączki, w tym spowodowane odczynem poszczepiennym; leczenie bólu i gorączki występujących w przebiegu grypy

NUROFEN DLA DZIECI 125 mg - skład:

1 czopek zawiera 125 mg ibuprofenu; substancja pomocnicza: tłuszcz stały

NUROFEN DLA DZIECI 125 mg - dawkowanie:

dla dzieci o wadze od 12,5 kg do 17 kg (od 2 do 4 lat) dawka początkowa to 1 czopek. W razie potrzeby, 1 czopek po 6 do 8 godz. Nie stosować więcej niż 3 czopki (375 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Dla dzieci o wadze od 17 kg do 20,5 kg (od 4 do 6 lat): dawka początkowa to 1 czopek. W razie potrzeby, 1 czopek po 6 godzinach. Nie stosować więcej niż 4 czopki (500 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Leku nie należy stosować u dzieci o wadze mniejszej niż 12,5 kg, dla nich zalecane są produkty zawierające mniejszą zawartość ibuprofenu.

NUROFEN DLA DZIECI 125 mg - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na ibuprofen oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; niekontrolowana niewydolność serca; toczeń rumieniowaty; ciężka niewydolność serca; trzeci trymestr ciąży; nie stosować u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały skurcz oskrzeli, astma, katar lub pokrzywka w wywiadzie; nie stosować u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz u osób z krwawieniem z przewodu pokarmowego

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.