

NUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg, 20 kapsułek



cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	kapsułki
Producent	RECKITT BENCKISER
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

NUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

NUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg- wskazania:

do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej), w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, np. bólu głowy, bólu miesiączkowego, bólu zęba; w leczeniu gorączki i bólu związanego z przeziębieniem

NUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg - skład:

1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu; pozostałe składniki: Makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, czerwień koszenilowa (E 124), Opacode WB White NS-78-18011 o składzie: tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, Hypromeloza 3 cP, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyna

NUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg - dawkowanie:

dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej) - dawka początkowa 1 kapsułka (400 mg ibuprofenu), popijając wodą; w razie potrzeby przyjmować 1 kapsułek (400 mg ibuprofenu) co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 kapsułki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

NUROFEN EXPRESS FORTE 400 mg - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku; występowanie w przeszłości duszności, astmy, nieżytu nosa, obrzęku lub pokrzywki podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ); owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie; występowanie krwawienia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe

leki przeciwzapalne); niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; ostatni trymestr ciąży; poważne odwodnienie (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów); krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie; wiek poniżej 12 lat

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.