

NUROFEN FORTE 400 mg, 12 tabletek

cena: 9,99 PLN



Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	tabletki
Producent	RECKITT BENCKISER
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

NUROFEN FORTE - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

NUROFEN FORTE - wskazania:

do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej) w objawowym leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, np. bólu głowy, bólu miesiączkowego, bólu zęba; w leczeniu gorączki i bólu związanego z przeziębieniem

NUROFEN FORTE - skład:

1 tabletkę zawiera 400 mg ibuprofenu; pozostałe składniki: rdzeń tabletki - kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna; otoczka cukrowa - karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000; tusz do nadruku - Opacode S-1-15094 (szelak, żelaza tlenek czerwony (E 172), glikol propylenowy, simeticon)

NUROFEN FORTE - dawkowanie:

dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej) - dawka początkowa 1 tabletkę (400 mg ibuprofenu), popijając wodą; w razie potrzeby przyjmować 1 tabletkę (400 mg ibuprofenu) co 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.

NUROFEN FORTE - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na ibuprofen, czerwień koszenilową (E124) lub którykolwiek ze składników leku; występowanie w przeszłości duszności, astmy, nieżyty nosa, obrzęku lub pokrzywki podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ); owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie;

występowanie krwawienia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne); niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; ostatni trymestr ciąży; poważne odwodnienie (z powodu wymiotów, biegunki lub niedostatecznego przyjmowania płynów); krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie; wiek poniżej 12 lat

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.