

# PARACETAMOL HASCO 120 mg/5 ml SMAK TRUSKAWKOWY, 150 g



cena: 17,99 PLN

## Opis słownikowy

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Główny składnik    | paracetamol                      |
| Postać             | zawiesina                        |
| Producent          | HASCO-LEK                        |
| Rodzaj rejestracji | lek OTC                          |
| Zastosowanie       | przeciwbólowe, przeciwgorączkowe |

## Opis produktu

### PARACETAMOL HASCO 120 mg/5 ml - działanie:

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

### PARACETAMOL HASCO 120 mg/5 ml - wskazania:

gorączka i bóle różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu) oraz dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy). Lek stosuje się u niemowląt od 0 do 3 miesiąca życia do leczenia objawowego gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

### PARACETAMOL HASCO 120 mg/5 ml - skład:

5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu; pozostałe składniki: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sacharyna sodowa (E 954), sodu benzoesan (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat truskawkowy, woda oczyszczona

### PARACETAMOL HASCO 120 mg/5 ml - dawkowanie:

jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przeciętna jednorazowa dawka paracetamolu wynosi 10 do 15 mg na kilogram masy ciała. W razie konieczności dawkę można powtarzać, nie częściej niż co 4-6 godzin, do 4 razy na dobę, czyli maksymalnie 60 mg/kg mc./dobę.

### PARACETAMOL HASCO 120 mg/5 ml - przeciwwskazania:

uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby; ciężka niewydolność nerek; choroba alkoholowa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.