


POLOPIRYNA GARDŁO 8,75 mg o smaku pomarańczowym, 24 pastylki do ssania



cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	pastylki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwzapalne

Opis produktu

POLOPIRYNA GARDŁO - działanie:

przeciwbólowe i przeciwzapalne

POLOPIRYNA GARDŁO - wskazania:

krótkotrwałe łagodzenie objawów związanych ze stanem zapalnym gardła, który objawia się podrażnieniem, bólem, obrzękiem i trudnością w przełykaniu - u dorosłych i młodzieży od 12 lat

POLOPIRYNA GARDŁO - skład:

1 pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu; substancje pomocnicze: izomalt (E953), maltitol (E965), czerwień koszenilowa (E124), żółcień pomarańczowa (E110), acesulfam potasowy (E950), makrogol 300 (E1521), aromat pomarańczowy (limonen (50,0%-100%), dekanal (0,0%-10%), cytral, cytronelol (0,1%-1,0%)), lewomentol

POLOPIRYNA GARDŁO - dawkowanie:

dorośli i młodzież od 12 lat: 1 pastylka twarda co 3 do 6 godzin, w razie potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 5 pastylek w ciągu doby.

POLOPIRYNA GARDŁO - przeciwwskazania:

- uczulenie na flurbiprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- wystąpienie kiedykolwiek w przeszłości astmy, niespodziewanych odgłosów podczas oddychania lub trudności w oddychaniu, wydzieliny z nosa,
- obrzęku twarzy lub wysypki skórnej ze świądem (pokrzywka) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
- wrzód w żołądku lub jelitach (dwa lub więcej epizodów wrzodów żołądka lub dwunastnicy)

- krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego
- ciężkie zapalenie jelita grubego lub choroby krwi związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
- III trymestr ciąży
- ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu