

POLOPIRYNA GARDŁO spray, 15 ml



cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	spray
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwzapalne

Opis produktu

POLOPIRYNA GARDŁO spray - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne

POLOPIRYNA GARDŁO spray - wskazania:

do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła, takich jak podrażnienie, ból gardła, trudności z przełykaniem i obrzęk u osób w wieku 18 lat i powyżej

POLOPIRYNA GARDŁO spray - skład:

1 dawka leku (3 rozpylenia) zawiera: substancję czynną: 8,75 mg flurbiprofenu; pozostałe składniki: sacharyna sodowa (E 954), kwas cytrynowy, sodu wodorotlenek, disodu fosforan dwunastowodny, betadeks (E 459), hydroksypropylobetadeks, aromat wiśniowy, woda oczyszczona. Skład aromatu wiśniowego: składniki nadające smak i zapach, etanol, trioctan glicerolu, glikol propylenowy (E 1520), kwas askorbowy, DL-alfa-tokoferol, woda.

Jedno rozpylenie zawiera 2,92 mg flurbiprofenu, 1 ml roztworu zawiera 17,16 mg flurbiprofenu

POLOPIRYNA GARDŁO spray - dawkowanie:

dorośli: jedna dawka (3 rozpylenia aerozolu) na tylną część gardła co 3-6 godzin, w razie potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 5 dawek (15 rozpyleń) w okresie 24 godzin. Nie wdychać podczas rozpylania aerozolu.

POLOPIRYNA GARDŁO spray - przeciwwskazania:

- uczulenie na flurbiprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- wystąpienie kiedykolwiek w przeszłości astmy, niespodziewanych odgłosów podczas oddychania lub trudności w oddychaniu, wydzieliny z nosa,
- obrzęku twarzy lub wysypki skórnej ze świądem (pokrzywka) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych
- dwa lub więcej epizody wrzodów żołądka, krwawienia lub owrzodzenia jelit
- występowanie kiedykolwiek ciężkiego zapalenia okrężnicy (zapalenie jelita grubego)
- występowanie kiedykolwiek zaburzenia krzepnięcia lub problemy z krwawieniem po przyjęciu NLPZ
- ostatnim trymestr ciąży
- ciężka niewydolność serca, nerek lub wątroby

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu