

PROLIVER DIABETO, 30 tabletek

cena: 17,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	AFLOFARM
Rodzaj rejestracji	suplement diety
Zastosowanie	wsparcie metabolizmu węglowodanów, wsparcie wątroby

Opis produktu

PROLIVER DIABETO - działanie:

składniki suplementu pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby (wyciąg z liści karczocha), wspomagają trawienie (wyciąg z korzenia cykorii) oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi (wyciąg z zielonej herbaty). Wyciąg z liści morwy białej wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

PROLIVER DIABETO - skład:

substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z liści morwy białej, L-asparaginin L-ornityny, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, winian cholina, substancja wiążąca: poliwinylpirolidon, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści karczocha, wyciąg z zielonej herbaty, substancja przeciwbrylająca: dwutlenek krzemu, wyciąg z korzenia cykorii, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, wyciąg z liści Gymnema sylvestre, barwnik: węglan wapnia, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, chlorek chromu (III), barwniki: żółcień chinolinowa, brąz HT, czerń brylantowa PN oraz zieleń S, substancje glazurujące: воск pszczeli biały oraz воск carnauba. Żółcień chinolinowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

W 6 tabletkach: L-asparaginin L-ornityny 600 mg, cholina 120 mg, wyciąg z zielonej herbaty 100 mg, w tym 3-galusan (-) epigalokatechiny (EGCG) nie więcej niż 95 mg, wyciąg z liści karczocha 150 mg, wyciąg z korzenia cykorii 69 mg, wyciąg z liści morwy białej (Morus alba L.) 850 mg, w tym: 1-deoksynojirimycyna (DNJ) 8,5 mg, wyciąg z liści Gymnema sylvestre 50 mg, w tym: kwas gymnemowy 12,5 mg; chrom 200 µg (500% referencyjnej wartości spożycia)

PROLIVER DIABETO - dawkowanie:

dorośli: 2 tabletki 3 razy dziennie, popijając wodą. Preparat zaleca się spożywać podczas lub bezpośrednio po posiłku. Spożycie 3-galusanu (-) epigalokatechiny w ciągu dnia powinno wynosić poniżej 800 mg.

PROLIVER DIABETO - przeciwwskazania:

- uczulenie na którykolwiek ze składników produktu
- produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 18 roku życia, kobiety w ciąży lub karmiące piersią
- produktu nie należy spożywać tego samego dnia z innymi produktami zawierającymi zieloną herbatę
- nie należy spożywać produktu na czczo
- u osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.