

RECIGAR 1,5 mg, 100 tabletek



cena: 57,49 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	ADAMED
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	rzucanie palenia

Opis produktu

RECIGAR 1,5 mg - działanie:

cytyzyna stopniowo wypiera nikotynę z organizmu. Dzięki temu zmniejsza się uzależnienie od nikotyny i możliwe jest odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji (głodu nikotynowego)

RECIGAR 1,5 mg - wskazania:

w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić

RECIGAR 1,5 mg - skład:

1 tabletkę zawiera 1,5 mg cytyzyny, pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: hypromeloza, mannitol, skrobia kukurydziana, krzemian glinowo-magnezowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Skład otoczki: AquaPolish P green Project 16712 (hypromeloza (E464), celuloza-br mikrokrystaliczna (E460), talk (E553b), glicerol, tytanu dwutlenek (E171), lak żółcieni chinolinowej (E104), lak indygotyny (niebieski 2) (E132)), aromat mentolowy proszek (SC552873), aspartam (E951)].

RECIGAR 1,5 mg - dawkowanie:

jedno opakowanie leku Recigar (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni. Lek należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem:

- od 1 do 3 dnia - 1 tabletkę co 2 godziny, maksymalnie 6 tabletek na dobę
- od 4 do 12 dnia - 1 tabletkę co 2,5 godziny, maksymalnie 5 tabletek na dobę
- od 13 do 16 dnia - 1 tabletkę co 3 godziny, maksymalnie 4 tabletki na dobę
- od 17 do 20 dnia - 1 tabletkę co 5 godzin, maksymalnie 3 tabletki
- od 21 do 25 dnia 1-2 tabletki na dobę, maksymalnie do 2 tabletek na dobę

Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5. dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowolający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie

ponownie.

RECIGAR 1,5 mg - przeciwwskazania:

- uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- niestabilna dławica piersiowa
- przebyty niedawno zawał mięśnia sercowego
- klinicznie istotne zaburzenia rytmu serca
- niedawno przebyty udar mózgu
- ciąża i karmienie piersią