


SANOHEPATIC 70 mg, 60 tabletek



cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	NATUR PRODUKT PHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	wsparcie wątroby

Opis produktu

SANOHEPATIC 70 mg - działanie:

sylimaryna stabilizuje lipidy błon komórkowych komórek wątrobowych, wykazując działanie ochronne wobec mięszu wątroby

SANOHEPATIC 70 mg - wskazania:

tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w objawowym leczeniu zaburzeń trawienia, uczucia pełności i niestrawności oraz we wspomaganiu funkcji wątroby, po wykluczeniu przez lekarza poważnych schorzeń

SANOHEPATIC 70 mg - skład:

jedna tabletkę powlekana zawiera 120,07 mg wyciągu (jako wyciąg suchy oczyszczony i standaryzowany) z Silybum marianum (L.) Gaertner, fructus (owoc ostropestu) DER 20-35:1, co odpowiada 70 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: aceton 96% (V/V); pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna krzemowana: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna; kroskarmeloza sodowa; magnezu stearynian; otoczka tabletki Aqua Polish D green 674.05 PVA, o składzie: kopolimer szczepiony makrogolu i alkoholu poli(winylowego), hydroksypropyloceluloza, glicerol, talk, krzemionka koloidalna uwodniona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), błękit brylantowy FCF, lak (E 133), indygokarmin, lak (E 132)

SANOHEPATIC 70 mg - dawkowanie:

dorośli i osoby w podeszłym wieku: na początku leczenia zaleca się stosować 2 tabletki powlekane trzy razy na dobę (co odpowiada 140 mg sylimaryny w dawce pojedynczej i 420 mg sylimaryny w dawce dobowej). Jako dawkę podtrzymującą zaleca się stosować 2 tabletki powlekane 2 razy na dobę (co odpowiada 280 mg sylimaryny).

SANOHEPATIC 70 mg - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na ostropest plamisty, sylimarynę, rośliny z rodziny Asteraceae (astrowate, dawniej złożone Compositae) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.