

SCOPOLAN COMPOSITUM, 10 tabletek



cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	HERBAPOL WROCŁAW
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, rozkurczowe

Opis produktu

SCOPOLAN COMPOSITUM - działanie:

rozkurczowe, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

SCOPOLAN COMPOSITUM - wskazania:

w krótkotrwałym leczeniu dolegliwości bólowych o dużym nasileniu w stanach skurczowych:

- przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego)
- dróg żółciowych (np. kolka żółciowa)
- układu moczowo-płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie)

SCOPOLAN COMPOSITUM - skład:

substancjami czynnymi leku są: butylbromek hioscyny (Hyoscini butylbromidum) 10 mg, metamizol sodowy jednowodny (Metamizolum natrium monohydricum) 250 mg; substancje pomocnicze to: sacharoza, talk, skrobia ziemniaczana, guma arabska, żelatyna wieprzowa, glicerol, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171)

SCOPOLAN COMPOSITUM - dawkowanie:

dorośli: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo. Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę.

SCOPOLAN COMPOSITUM - przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (leki o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych)
- uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne
- zmiany w obrazie morfologicznym krwi: leukopenia (mała liczba leukocytów, czyli krwinek białych), granulocytopenia (mała

- liczba granulocytów), niedokrwistość (anemia)
- wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (enzymu uczestniczącego w przemianach zachodzących w krwinkach czerwonych)
 - ostra porfiria wątrobowa (choroba z silnymi bólami brzucha, wymiotami, osłabieniem i bólami mięśni oraz zaburzeniami psychicznymi)
 - ostra niewydolność nerek lub wątroby
 - jaskra z wąskim kątem przesączania (choroba oczu przebiegająca ze wzrostem ciśnienia śródgałkowego)
 - rozrost prostaty (gruczołu krokowego)
 - niedrożność porażenna jelit (zatrzymanie procesu przemieszczania się treści jelitowej)
 - zaparcia atoniczne
 - zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka
 - zwężenie szyi pęcherza moczowego
 - tachykardia
 - nużliwość mięśni (myasthenia gravis) (choroba przebiegająca z zaburzeniami czynności i znacznym osłabieniem mięśni)
 - patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.